

PRYSZCZYCA REALNE ZAGROŻENIE !

- Polska pozostaje krajem, w którym nie stwierdzono wirusa pryszczycy, a intensyfikacja działań prewencyjnych MRiRW związana jest z zagrożeniem transmisją wirusa z krajów sąsiednich, gdzie choroba występuje i gdzie potwierdzone są kolejne ogniska pryszczycy.
- Trwają intensywne szkolenia z zakresu identyfikacji czynników ryzyka i zasad bioasekuracji; kontynuacją akcji edukacyjnych objęci są rolnicy, hodowcy oraz środowiska branżowe. W tym obszarze przypominamy o ograniczeniu ruchu osobowego i ograniczeniu wjazdu pojazdów do gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta wrażliwe.
- Przy planowaniu i wykonywaniu kontroli na miejscu, przypomina się o doraźnej dezynfekcji pojazdów i ograniczaniu kontroli do przypadków niezbędnych. Zaleca się uwzględnianie komunikatów dotyczących zagrożenia pryszczycą, umieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.
- W związku z fałszywymi informacjami, pojawiającymi się coraz częściej zwłaszcza w przestrzeni mediów społecznościowych, MRiRW przypomina:

W Polsce obowiązuje zakaz transportu żywych zwierząt parzystokopytnych (w szczególności z gatunków: bydło, owce, kozy i świnię), produktów pochodzenia zwierzęcego oraz obornika, słomy i siana z tych terenów Słowacji i Węgier, które objęte są ogniskami pryszczycy oraz ze stref buforowych, bezpośrednio związanych z potwierdzonymi ogniskami (strefy wyznaczają narodowe służby sanitarne Słowacji, Węgier i Austrii).

Transport zwierząt - które przejścia graniczne?

Transport zwierząt żywych zwierząt parzystokopytnych (w szczególności z gatunków: bydło, owce, kozy i świnię), produktów pochodzenia zwierzęcego oraz obornika, słomy i siana z innych terenów niż wskazane powyżej, możliwy jest tylko na **10** wyznaczonych przejściach granicznych:

- województwo podkarpackie: przejście graniczne Barwinek;
- województwo małopolskie: przejścia graniczne Chyżne i Piwniczna;
- województwo śląskie: przejście graniczne Zwardoń, Boguszowice – Cieszyn, autostrada A1 – Gorzyczki dla ruchu z terytorium Czech oraz przejście graniczne Chałupki dla ruchu z terytorium Słowacji;
- województwo opolskie: przejście graniczne Trzebina i Głucholazy;
- województwo dolnośląskie: przejście graniczne Kudowa – Słone

Prewencja w pryszczycy to bioasekuracja

Resort przypomina także podstawowe zasady prewencji - zasady bioasekuracji, które bezwzględnie obowiązywać powinny wszystkich rolników, hodowców i osoby pośredniczące w transporcie zwierząt i towarów.

Zwierzęta wprowadzane do gospodarstwa muszą pochodzić z wiadomego źródła i być zidentyfikowane; zwierzęta spoza Polski muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny (uwaga: dla trzody chlewnej świadectwo

zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny obowiązuje także w obrocie krajowym).

Przed włączeniem nowo zakupionych zwierząt do stada, osobniki powinny być odizolowane przez okres min. 14, a optymalnie 21 dni.

Pasze, ściółka przywożone do gospodarstwa muszą pochodzić z ustalonego źródła i być przechowywane w izolacji od zwierząt nie pochodzących z gospodarstwa.

Należy ograniczyć do minimum kontakt zwierząt z gospodarstwa z innymi osobnikami, w tym na pastwiskach (ogrodzenia, pastuchy elektryczne).

Konieczne należy przestrzegać zasad mycia i dezynfekcji urządzeń i narzędzi mających kontakt ze środowiskiem przebywania zwierząt po każdym użyciu. Zalecamy nieużywanie narzędzi i sprzętu poza gospodarstwem.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej; przed i po obsłudze zwierząt, pasz lub ściółki konieczne jest mycie rąk i ich dezynfekcja (np. 0,2% roztworem kwasu cytrynowego) oraz całkowita zmiana obuwia i ubrania.

W wejściach do budynków inwentarskich powinno się stosować maty (kuwety) ze środkiem dezynfekcyjnym (działającym na wirusa pryszczycy) i na bieżąco ten środek uzupełniać.

Konieczne jest ograniczenie odwiedzin w gospodarstwach osób postronnych do niezbędnego minimum. Należy rozważyć w gospodarstwach prowadzenie rejestru wejść i wyjść osób oraz ruchu pojazdów (wjazdy i wyjazdy), co jest szczególnie ważne ze względu na nadchodzące spotkania w czasie Świąt Wielkanocnych

W przypadku zaobserwowania objawów choroby zakaźnej, a w szczególności: podwyższonej wewnętrznej ciepłoty ciała 40-42°C, ślinotoku, kulawizny ze zmianami na racicach i szparach międzyracicowych lub zmian na wymionach – należy natychmiast zgłosić to lekarzowi weterynarii, policji lub władzom gminnym i zatrzymać jakiegokolwiek przemieszczanie się zwierząt, rzeczy i osób z tego gospodarstwa.